


# Vorgehen - Verdacht auf/Infektion mit Sars-CoV-2-Virus



**M\*/T\*/B\* hat Corona-Positivtest**


- Info an Gesundheitsamt
- Info an alle TN\* der Trainingsgruppe über T, B oder AL\*

**TN** der Trainingsgruppe können sein bzw. sind in der Regel **Enge Kontaktpersonen**

## Sachlage:

1. Beurteilung, ob eine Enge-Kontaktpersonen-Situation vorliegt, ist immer mit großen Unsicherheiten verbunden, weil die persönliche Wahrnehmung der Beteiligten immer sehr unterschiedlich ist. Auch Gesundheitsamt ist hier auf die Schilderung der Beteiligten angewiesen und entscheidet nie aus eigener Anschauung
2. Gesundheitsamt Stadt München ist überlastet und informiert nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen die Kontaktpersonen

**ESV muss zum Schutz aller eigene Entscheidungen treffen, wenn innerhalb einer Trainingsgruppe ein Corona-Fall auftritt**




**Trainerschaft:** Selbsteinschätzung durch T\* der betroffenen Trainingsgruppe, ob er Enge Kontaktperson ist

- Enge Kontaktperson: frühestens 5 Tage nach Letztkontakt PCR-Test machen, nach negativem PCR-Test wieder Trainingsteilnahme, es sei denn es gibt schärfere Anordnungen des Gesundheitsamts
- Keine Enge Kontaktperson, Durchführung eines AGS durch Fachpersonal, kein Selbsttest

**Sportlerinnen und Sportler**

- 7 Kalendertage – Trainings-und/oder Spiel-Abstinenz für alle S\* der Quellperson-Trainingsgruppe (= Personen, die im möglichen Infektionszeitraum im Training waren)
- Bei Symptombefreiheit
- AGS bei Erwachsenen egal, ob Geimpft oder Genesen
  - Kein AGS bei Kindern/Schülern, wenn diese schon in der Schule getestet wurden

\* Gewählte Abkürzungen: **AL:** Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter / **AGS:** Antigen-Schnelltest am besten nicht als Selbsttest, sondern als derzeit kostenlosen Bürgertest durch Fachpersonal durchführen lassen / **B:** Betreuerin oder Betreuer / **M:** Mitglied / **S:** Sportlerin, Sportler / **T:** Trainerin, Trainer / **TN:** Teilnehmerin, Teilnehmer



## Corona Symptome

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Luftnot, Fieber, Gliederschmerzen, Kein Geruchs-/ kein Geschmackssinn

## Corona – ab wann ansteckend ?

- Asymptomatischer Fall:  
**Max. 3 Tage vor Auftreten der Symptome bei der Quellperson und 14 Tage danach (bis Tag 7 höchste Infektiosität)** - daher immer rückrechnen bei der Frage, wer informiert werden muss –
- Asymptomatischer Fall mit unbekanntem Infektionsdatum: 2 Tage vor Probenahme-Datum bis 14 Tage nach Probenahme-Datum.

## Enge Kontaktperson: Situationen

- Aufenthalt im Nahfeld (< 1,5 m Abstand) > 10 min ohne adäquaten Schutz
- Gespräch (< 1,5 m Abstand) ohne adäquaten Schutz unabhängig von Dauer oder direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret
- Aufenthalt in demselben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min